

RACE RM ➤

METOMINOSTROBIN 15% + TEBUCONAZOLE 30% SC

USO: fungicida (foliar).

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos:

- 1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad.
- 2- Poner el agitador o retorno en funcionamiento y añadir el contenido del envase del producto.
- 3- Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la completa homogenización del preparado.

Agitar bien el envase antes de utilizar. Preparar lo que usará en el día, no es conveniente dejar el preparado de un día para el otro.

Equipo, volúmenes y técnicas de aplicación: RACE RM puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco, utilizando un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha y una presión superior a 40 lb/pg², para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO: No presenta condiciones especiales de uso. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30° C, Humedad relativa menor a 40 %, Viento mayor a 15 KPH.

Cultivo	Enfermedad	Dosis (cc/Ha)	Momento de aplicación
Soja	Mancha marrón de la soja (<i>Septoria glycines</i>) Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (<i>Cercospora kikuchii</i>) Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>)	300*	Aplicar desde R3 hasta R6 cuando se observen los primeros síntomas en la planta
	Roya asiática de la soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)		Aplicar el producto de forma preventiva cuando las condiciones

			sean predisponentes para la enfermedad, o al detectarse los primeros síntomas de la enfermedad. En caso de que las condiciones sigan siendo favorables y se detecten nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.
Trigo	<p>Mancha amarilla (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)</p> <p>Roya anaranjada del trigo (<i>Puccinia recondita</i>)</p> <p>Mancha de la hoja del Trigo (<i>Septoria tritici</i>)</p>	500* a 600*	Aplicar desde el estadio de hoja bandera enrollada (Z.3.7) a hoja bandera desplegada (Z.3.9) cuando se registren síntomas (pústulas y/o manchas) en la hoja bandera menos 2 (HB-2). Utilizar las dosis altas en el sudeste de Bs As donde el llenado de grano es más prolongado y se busque mayor residualidad del tratamiento.
Maíz	<p>Roya común (<i>Puccinia sorghi</i>)</p> <p>Tizón de la hoja (<i>Helminthosporium turcicum</i>)</p>	500* a 600*	La aplicación debe ser realizada ante la presencia de de las primeras pústulas a partir del estadio vegetativo V8 (octava hoja totalmente expandida) – V10. Utilizar la dosis mayor ante alta presión de la enfermedad y condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la misma.

*Aplicar con 500 cc/ha de coadyuvante a base de esteres metílicos de Soja con emulsionantes.

Uso de Coadyuvantes: Se recomienda aplicar RACE RM con coadyuvante a base de esteres metílicos de aceite de Soja (500 CC.). Mejora la llegada y distribución del producto en el cultivo y la penetración de los activos en las hojas. En el caso de aguas duras, usar corrector, ya que la eficacia se ve afectada y puede producirse precipitado.

RESTRICCIONES DE USO:

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 Hs.

Periodo de carencia: 35 días para Trigo; 40 días para Soja y 60 días para Maíz.

En caso que el cultivo o subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el Límite Máximo de Residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:

RACE RM es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de soja. No mezclar RACE RM con productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad de cualquier mezcla que se intente realizar.

FITOTOXICIDAD:

No se observan casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.