

DOSIS Y RECOMENDACIÓN STAGGER

En base equivalente del registro de ECOPART PLUS

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho	Bolsa del pastor <i>(Capsella bursa pastoris)</i> Capiquí <i>(Stellaria media)</i> Cardos <i>(Carduus spp.)</i> Cien nudos <i>(Polygonum aviculare)</i> Enredadera anual <i>(Polygonum convolvulus)</i> Falsa biznaga <i>(Ammi majus)</i> Flor de pajarito <i>(Fumaria officinalis)</i> Girasol guacho <i>(Helianthus annuus)</i> Manzanilla <i>(Matricaria chamomilla)</i> Mastuerzo <i>(Coronopus didymus)</i> Mostacilla <i>(Myagrurn rugosum)</i> Mostaza <i>(Hirschfeldia incana)</i> Nabo <i>(Brassica campestris)</i> Nabón <i>(Raphanus sativus)</i> No me olvides <i>(Anagallis arvensis var. caerulea)</i> Ortiga mansa <i>(Lamium amplexicaule)</i> Perejilillo <i>(Bowlesia incana)</i> Quinoa blanca <i>(Chenopodium album)</i> Tolanga <i>(Stachys arvensis)</i> Verónica	80 cm ³ /ha de STAGGER + 8 gr/ha de metsulfuron metil	Aplicar STAGGER + metsulfuron en aplicaciones de barbecho químico como complemento a la aplicación de glifosato para mejorar el control, velocidad de acción y residualidad del tratamiento. Aplicar con malezas en activo crecimiento de 2 a 4 hojas y rosetas de hasta 8 cm de diámetro.

	(<i>Veronica arvensis</i>) Violeta silvestre (<i>Viola arvensis</i>)	
	Abrepuño amarillo (<i>Centaurea solstitialis</i>)	Aplicar en mezcla de tanque con 2,4 D: 150 cc/Ha

Restricciones de

uso:

No usar en suelos calcareos o con PH mayor que 8

Para la siembra de Soja y Maíz deben transcurrir 90 días y ocurrir lluvias (100 mm)

No presenta restricciones de uso para barbechos de Trigo